

# Primeros auxilios para convulsiones

(Convulsiones tonicoclónicas generalizadas)



La mayoría de las convulsiones que acontecen a las personas con epilepsia no constituyen emergencias médicas. Generalmente duran sólo uno o dos minutos sin causar daños y no suelen requerir una visita a la sala de emergencias.

Sin embargo, a veces existen buenas razones para solicitar ayuda de emergencia. En personas que no tienen epilepsia, una convulsión podría ser señal de enfermedad grave.

Otras razones para llamar a una ambulancia:

- La convulsión dura más de 5 minutos
- No se localiza una identificación que asiente: epilepsia o trastorno convulsivo
- Recuperación lenta, una segunda convulsión o dificultad para respirar después de la crisis
- Embarazo u otro diagnóstico médico
- Cualquier señal de lesión o enfermedad

 **EPILEPSY FOUNDATION®**  
*Not another moment lost to seizures®*  
1-866-748-8008 • [www.fundacionparalaepilepsia.org](http://www.fundacionparalaepilepsia.org)


# Primeros auxilios para convulsiones

(Crisis parciales complejas, psicomotrices, de lóbulo temporal)

## 1. Reconocer los síntomas comunes



## 2. Seguir los pasos de primeros auxilios



Antes de que se les pueda dejar solas, las personas que han tenido este tipo de convulsión deben estar completamente conscientes y haber recobrado el conocimiento. Asegúrese de que sepan la fecha,

dónde están y adónde se dirigen. La confusión puede ser peligrosa porque a veces dura más que la convulsión propiamente. Si la persona no recobra el conocimiento por completo, solicite asistencia médica.

 **EPILEPSY FOUNDATION®**  
*Not another moment lost to seizures®*  
1-866-748-8008 • [www.fundacionparalaepilepsia.org](http://www.fundacionparalaepilepsia.org)